

Bijlage 3

Tabellen

behorend bij het internationale literatuuronderzoek,
onderdeel van de voorstudie naar geweld tegen psychiatrische patiënten

Tabel 1: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder patiënten (intramuraal, ambulant, dagbehandeling) met ernstige psychiatrische problematiek								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Bergman & Ericsson, 1996	55 intramurale patiënten (22-76 jaar) met schizofrenie, psychotische, stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen	Zweden, Stockholm	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Conflict Tactics Scale (CTS)	Mild en ernstig fysiek geweld door partner	Overall: 38.0 Ernstig: 20.0	Univariaat: Schizofrene en persoonlijkheidsstoornissen tov stemmingsstoornissen (beschermend)
Brekke et al., 2001	172 ambulante patiënten (18-60 jaar) met schizofrenie of schizo-affectieve stoornissen	VS, Los Angeles	Prospectieve longitudinale studie gedurende 3 jaar; elk half jaar een interview.	Afgelopen 3 jaar	Gestructureerde vragen	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	38.0	Multivariaat: Ernstige klinische symptomen Middelenmisbruik
Brunette & Drake 1997	172 ambulante patiënten (18-55 jaar) met verslavingsstoornissen en comorbide schizofrenie of schizo-affectieve stoornissen	VS, New Hampshire	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Victimisatie schaal van het Quality of Life Interview (QOLI)	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Gewelddadig: 32.4 vrouwen 16.8 mannen Niet-gewelddadig: 27.0 vrouwen 19.1 mannen	Univariaat: Vrouwen (gewelddadig misdrijf)
Chapple et al., 2004; Jablensky et al., 1999	962 ambulante, intramurale, particuliere en dakloze patiënten (18-64 jaar) met een psychotische stoornis	Australië, Australian Capital Territory, Queensland, Victoria, Western Territory	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Gestructureerde vraag	Ernstig (fysiek) geweld	17.9	Univariaat: Vrouw Dakloos Verslavingsproblematiek (lifetime) Recente arrestatie Sociale beperkingen Symptoom: disorganisatie
Fitzgerald et al., 2005	348 ambulante en kortdurend opgenomen patiënten (18 jaar en ouder) met schizofrenie, schizo-affectieve en schizofreniforme	Australië, Dandenong, een buitenwijk van Melbourne	Cross-sectioneel	1 maand	Victimisatie schaal van het Quality of Life Interview (QOLI)	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Gewelddadig: 4.3 Niet-gewelddadig: 11.2	Multivariaat: Geen dagbesteding Recente arrestatie

	stoornissen							
Goodman et al., 1999	50 ambulante patiënten (volwassenen) met schizofrene, bipolaire of psychotische stoornissen	VS, Baltimore	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	3 aangepaste subschalen van de Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)	Mild en ernstig fysiek en seksueel geweld, verwonding door partner, familie of vreemde	Fysiek: 58.6 vrouwen 52.4 mannen Seksueel: 41.4 vrouwen 42.9 mannen Verwonding: 34.5 vrouwen 42.9 mannen	-
Goodman et al., 2001	782 intramurale en ambulante patiënten (18-60 jaar) met schizofrenie, schizo-affectieve, bipolaire en depressieve stoornissen	VS, Connecticut, Maryland, New Hampshire, North Carolina	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	2 subschalen van de Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)	Mild en ernstig fysiek en seksueel geweld door partner, familie of vreemde	Fysiek: 25.6 vrouwen 34.1 mannen Seksueel: 20.3 vrouwen 7.6 mannen	Univariaat: Mannen (fysiek geweld) Vrouwen (seksueel geweld) Multivariaat: Dakloos, fysieke mishandeling in de jeugd, seksueel misbruik in de jeugd, verslavingsproblematiek, psychiatrische opname in het afgelopen jaar, jonge leeftijd 1 ^e opname.
Hodgins, et al. 2007	205 intramurale patiënten (18-65 jaar) met schizofrenie, schizo-affectieve, bipolaire, depressieve stoornissen of middelengerelateer de psychose	GB, urbaan	Cross-sectioneel	6 maanden	Aanpassing van MacArthur Community Violence Interview (MCVI)	Mild en ernstig fysiek en seksueel geweld	48.0 vrouwen 57.0 mannen	Univariaat: Recent agressief gedrag
Kelly & McKenna (1997)	100 patiënten met ernstige, chronische psychiatrische problematiek	Ierland	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Gestructureerde vragen	Mild fysiek en emotioneel geweld, niet-gewelddadige misdrijven.	60.0	-
McPherson et al., 2007	324 moeders, ambulante patiënten (18-55 jaar) met schizofrenie, schizo-affectieve, depressieve en bipolaire stoornissen	VS, Michigan, urbaan	Longitudinaal; 20-maanden follow-up	Afgelopen jaar	Aanpassing van de Conflict Tactics Scale (CTS)	Mild en ernstig fysiek en seksueel geweld door partner	19.0	Multivariaat: Jong Verslavingsproblematiek Meerdere psychiatrische opnames (life time) Meerdere psychiatrische symptomen

Pandiani et al., 2007	2610 ambulante patiënten (18 jaar en ouder) met ernstige psychiatrische problematiek	VS, rurale gemeenschappen in Vermont	Cross-sectioneel registeronderzoek	Afgelopen jaar	Politie aangiftes van geweld	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	8.2 vrouwen 5.6 mannen 7.1 totaal	-
Sells et al., 2003	109 ambulante patiënten (20-64 jaar) en 197 patiënten (19-76 jaar) van een outreachende hulpverlening met verslavingsproblematiek, angst-, stemmings-, psychotische, of persoonlijkheidsstoornissen	VS, Connecticut	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Aanpassing van Exposure to Community Violence Instrument	Ernstig fysiek en seksueel geweld	-	Univariaat: Mannen (fysiek geweld) Vrouwen (seksueel geweld) Multivariaat: Co-morbide verslavingsproblematiek
Silver et al., 2005	382 jong volwassenen (21 jaar) met depressieve, angst-schizofreniforme, of verslavingsstoornissen (binnen een bevolkingssteekproef)	New Zealand, Dunedin	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Gestructureerde vragen	Ernstig fysiek en seksueel geweld	Fysiek: 33.8 Seksueel: 8.9	Multivariaat: Psychiatrische co-morbiditeit Angststoornissen (seksueel geweld) Schizofreniforme stoornissen en alcoholverslaving (fysiek geweld) Marihuana-verslaving (poging tot geweld)
Teplin et al., 2005	936 ambulante, dag- en intramurale patiënten (18 jaar en ouder) met een psychotische of stemmingsstoornis	VS, Chicago	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Victimisatie schaal uit de National Crime Victimization Survey	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Gewelddadig: 25.3 Diefstal (van de persoon): 21.2 Diefstal (van goederen): 28.0	Univariaat: Vrouw (seksueel geweld) African-American vs Hispanic en White Jong
Tham et al., 1995	184 acuut intramuraal opgenomen patiënten (volwassenen) met voornamelijk psychotische	GB, London	Cross-sectioneel	Afgelopen 6 maanden	Gestructureerde vragen	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld door partner	Fysiek: 5.4 Seksueel of emotioneel: 16.0	-

	stoornissen							
Thompson, 2007	189 intramurale patiënten (18 jaar en ouder) met chronische psychotische of stemmingsstoornis	VS, North Carolina	Cross-sectioneel	4 maanden	Gestructureerde vragen aan mantelzorgers over victimisatie van patiënt	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Gewelddadig: 8.0 Niet-gewelddadig: 20.0	-
Walsh et al., 2003	691 ambulante en intramurale patiënten (18-65 jaar) met een psychotische stoornis.	GB, London	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar.	Victimisatie-item van de Lancashire Quality of Life Profile (LQoLP)	Ernstig (fysiek) geweld	12.0 vrouwen 18.0 mannen 16.0 totaal	Multivariaat: Dakloos Druggebruik Daderschap Ernstige symptomen Co-morbide persoonlijkheidsstoornis
White et al., 2006	308 kortdurend intramuraal behandelde patiënten (volwassenen) met psychotische of stemmingsstoornissen	VS, San Francisco	Cross-sectioneel	Afgelopen 6 maanden	Victimisatie-item van de Quality of Life Interview (QOLI)	Gewelddadige misdrijven	25.6	Multivariaat: Vrouw Dakloos
Wood & Edwards, 2005	40 psychiatrisch patiënten (volwassenen) met schizofrenie, angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en eetstoornissen	GB	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Aanpassing van instrument National Crime and Victimization Study en British Crime Survey	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven door partner, familie of vreemden	50.0 22.5 (door familie) 20.0 (door partner of vrienden) 32.5 (door vreemden) 17.5 (door vage bekenden)	Univariaat: vrouw

Tabel 2: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder recent opgenomen patiënten met ernstige psychiatrische problematiek (betrekking hebbend op de periode voorafgaand aan de opname)								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Ash et al., 2003	119 recent opgenomen patiënten (17 – 63 jaar) met verslavingsproblematiek, schizofrenie, psychotische, stemmings- of persoonlijkheidsstoornissen	Australië, Adelaide	Cross-sectioneel	Afgelopen 3 maanden	Interview en medisch dossier	Ernstig fysiek geweld	8.4	Univariaat: vrouw
Cascardi et al., 1996	69 recent opgenomen patiënten (18 jaar en ouder) met affectieve of schizofrene stoornis	VS	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Conflict Tactics Scale (CTS)	Mild en ernstig fysiek geweld door partner of familielid	62.8 (door partner) 45.8 (door familielid)	-
Heru et al., 2006	110 recent opgenomen patiënten (18-65 jaar) met suïcidale ideatie of suïcidaal gedrag	VS	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld en verwonding door partner of familielid	Fysiek: 92.0 vrouwen 93.0 mannen Seksueel: 19.0 vrouwen 29.0 mannen Emotioneel: 92.0 vrouwen 83.0 mannen Verwonding: 32.0 vrouwen 39.0 mannen	Multivariaat: Slecht familie functioneren
Hiday et al., 1999	331 gedwongen opgenomen patiënten (18 jaar en ouder) met chronische schizofrenie, schizo-affectieve of psychotische stoornissen	VS, North Carolina	Cross-sectioneel	Afgelopen 4 maanden	Victimisatie schaal van het Quality of Life-Interview (QOLI)	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Overall: 27.2 Gewelddadig: 8.2 Niet-gewelddadig: 22.4	Multivariaat: Dakloosheid Middelenmisbruik Hogere opleiding
Mericle & Havassy,	419 acut opgenomen	VS, San Francisco	Cross-sectioneel	Afgelopen maand	Aanpassing van MacArthur	Mild en ernstig fysiek en seksueel	34.4	-

2008	patiënten (18-50 jaar) met schizofrenie, psychotische, angst, stemmingsstoornissen of verslavingsproblematiek				Community Violence Interview (MCVI)	geweld		
------	---	--	--	--	-------------------------------------	--------	--	--

Tabel 3: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder patiënten met ernstige psychiatrische problematiek in de periode na ontslag								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Honkonen et al., 2004	670 ambulante patiënten (15-64 jaar) met schizofrenie, na ontslag uit psychiatrisch ziekenhuis	Finland, ruraal en urbaan	Longitudinaal, 3-jaar follow-up.	Afgelopen 3 jaar	Gestructureerde vragen	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	Gewelddadig: 1.1 vrouwen 4.5 mannen 5.6 totaal Niet-gewelddadig: 2.3 vrouwen 5.4 mannen 7.7 totaal	Multivariaat: Slechte financiële situatie Alcoholmisbruik Daderschap
Schomerus et al. 2008	1208 schizofrenie patiënten (18-64 jaar), minimaal 1 jaar na laatste opname	GB, Frankrijk, Duitsland	Longitudinaal, 2-jaar follow-up cohort, elk half jaar een interview.	Afgelopen 2,5 jaar	Victimisatie- en ervaren veiligheidsschalen van het Quality of Life Interview (QOLI)	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven, ervaren veiligheid	Gewelddadig: 10.0 Niet-gewelddadig: 18.8	Multivariaat: Gewelddadig: Ernstige klinische symptomen Middelenmisbruik Recente arrestatie Niet-gewelddadig: Hogere opleiding, ernstige klinische symptomen Recente arrestatie Slechte financiële situatie
Silver et al., 2002	270 ontslagen patiënten (18-40 jaar) met schizofrenie, psychotische, stemmings-, persoonlijkheids-, en verslavingsstoornissen	VS, Pittsburgh	Longitudinaal, 1-jaar follow-up, elke 10 weken een interview	10 weken	Aanpassing van MacArthur Community Violence Interview (MCVI)	Ernstig fysiek en seksueel geweld	15.2	Multivariaat: Aggressief naar anderen Slechtere woonwijk Conflicten in relaties

Tabel 4: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder patiënten binnen de verslavingszorg								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Chase et al., 2003	103 vrouwelijke ambulante patiënten (21-65 jaar) met alcoholproblematiek	VS, Massachusetts	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	Subschaal van de Conflict Tactics Scale (CTS)	Mild en ernstig fysiek geweld door partner	Overall: 64.0 Ernstig: 22.0	Multivariaat: Ernst van de alcoholproblematiek Man en vrouw zien de alcoholproblematiek vd vrouw als oorzaak van de relatieproblemen Alcoholproblematiek vd partner Weinig positieve gevoelens over de vrouw
Chermack et al., 2008	489 ambulante en intramurale patiënten (18-63 jaar) met verslavingsproblematiek	VS, a Midwestern state	Prescreening ten behoeve van een longitudinaal evaluatie onderzoek	Afgelopen jaar	Aanpassing van de Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)	Mild en ernstig fysiek en emotioneel geweld en verwonding door partner	Fysiek: 51.0 Emotioneel: 73.0 Verwonding: 33.0	Multivariaat: Jong Mishandeling in de jeugd Depressie Cocaine gebruik Binge drinking Stimulantia gebruik Non-Caucasiërs vs Caucasian
El-Bassel et al., 2004	416 vrouwelijke patiënten (18-55 jaar) van een methadonprogramma	VS, New York City	Cross-sectioneel	6 maanden	Subschalen van de Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)	Mild en ernstig fysiek en seksueel geweld en verwonding door partner	Overall: 46.6 Fysiek: 30.9 Seksueel: 30.7 Verwonding: 18.4	Univariaat: Alleenstaand Middelbare school afgemaakt Meerdere seksuele partners in afgelopen jaar Gebruik van crackcocaine Non-White vs White
Haller & Miles, 2003	77 recent intramuraal opgenomen zwangere en post-partum vrouwen (volwassenen) met	VS, Pittsburgh	Cross-sectioneel	1 maand	Victimisatieschaal van de Aggressive-Acts Questionnaire (AAQ)	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld, vrijheidsberoving	Fysiek: 34.0 Seksueel: 28.0 Emotioneel: 70.0	Multivariaat: Mishandeling in de jeugd Ernst druggebruik Psychiatrische symptomen

	verslavingsproblematiek						Vrijheidsberoving: 42.0	gerelateerd aan drugsverslaving Borderline stoornis PTSD
Neale et al., 2005	560 recent opgenomen ambulante en intramurale patiënten (volwassenen) met (voornamelijk) heroïneverslaving	GB, Schotland	Baseline data uit een longitudinaal evaluatie onderzoek	6 maanden	1 gestructureerde vraag	Ernstig fysiek geweld	19.5 vrouwen 27.7 mannen 25.0 totaal	Multivariaat: Man Gebruik van crackcocaine Dakloos Ooit slachtoffer fysiek geweld Geen gebruik van heroïne in afgelopen 90 dagen
Rothman et al., 2008	238 patiënten (18 jaar en ouder) verwezen naar ambulante en intramurale verslavingszorg met alcoholproblematiek	VS, Boston	Longitudinaal evaluatie onderzoek, meting na 1 jaar behandeling	3 maanden	4 vragen uit de Women, Co-occurring Disorders, and Violence Study (WCODV)	Ernstig fysiek en seksueel geweld door familie, partner of vreemde	Overall: 13.0 Fysiek: 6.0 Seksueel: 3.0 Verkrachting: 5.7	-
Stevens et al., 2007	545 patiënten (volwassenen) van gedwongen verslavingszorgprogramma	GB, London, Kent Duitsland, Berlijn Zwitserland, Zurich Oostenrijk, Wenen	Baseline meting van longitudinaal evaluatie onderzoek	Afgelopen jaar	Aangepaste vragen uit de British Crime Survey	Gewelddadige en niet-gewelddadige misdrijven	GB: 63.5 Oostenrijk: 60.0 Zwitserland: 77.6 Duitsland: 76.5 Totaal: 68.4	Multivariaat: Jong Zwitserland vs Engeland Meer drugproblematiek Lifetime depressie Angst, spanningsklachten Recent ouderschap

Tabel 5: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder daklozen met (ongespecificeerde) psychiatrische problematiek								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Dean et al., 2007	632 dakloze ambulante patiënten (volwassenen) met chronische psychoses	GB, 4 steden	Longitudinaal, 2 jaar follow-up	Afgelopen 2 jaar	Victimisatieschaal van de Lancashire Quality of Life Profile (LQoLP)	Ernstig fysiek geweld	23.0	Multivariaat: Eerdere victimisatie Inadequaat contact met familieleden Vroege ontwikkeling psychose Co-morbide cluster B persoonlijkheidsstoornis
Goodman et al., 1995	99 (ex-)dakloze vrouwen, ambulante patiënten (21-71 jaar) met schizofrenie, schizo-affectieve, stemmingsstoornissen en middelmisbruik	VS, urbaan	Cross-sectioneel	1 maand	Aanpassing van de Conflict Tactics Scale (CTS)	Mild of ernstig fysiek of seksueel geweld door partner, familielid of vreemde	Overall: 28.0 Fysiek: 20.0 Seksueel: 15.0	Univariaat: Eerdere victimisatie
Heslin et al., 2007	974 dakloze vrouwen (15-44 jaar) waarvan een groot deel psychiatrisch patiënt of drugverslaafd	VS, Los Angeles	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	2 gestructureerde vragen	Ernstig fysiek en seksueel geweld	Fysiek: 33.0 Seksueel: 14.0	Multivariaat: Fysiek geweld: Dichterbij Skid Row Inkomen uit prostitutie Fysiek geweld voor 18 ^e jaar Psychotische symptomen Homo- of biseksueel Seksueel geweld: Latino (vs Black, White) Seksueel geweld voor 18 ^e Psychotische symptomen Weinig Latino bevolking in wijk
Lam & Rosenheck, 1998	1839 dakloze ambulante patiënten (volwassenen) met schizofrenie, psychotische, angst- stemmings-	VS, in 15 verschillen de steden	Longitudinaal onderzoek, 3- en 12- maanden follow-up	2 maanden	Gestructureerde vragen	Ernstig fysiek of seksueel geweld	44.1	Multivariaat: Vrouw Betaald werk White & Latino vs Afro-American Alcoholmisbruik Ernstige psychotische symptomen

	persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik							Recente veroordeling Eerdere victimisatie
Kushel et al., 2003	2577 daklozen (18-77 jaar) waarvan een groot deel psychiatrisch patiënt of drugverslaafd	VS, San Francisco	Cross-sectioneel	Afgelopen jaar	4 gestructureerde vragen	Ernstig fysiek of seksueel geweld	Overall: 32.3 vrouwen 27.1 mannen Fysiek: 30.6 vrouwen 26.6 mannen Seksueel: 9.4 vrouwen 1.4 mannen	Multivariaat: Algemeen: Jong Psychiatrische aandoening Prostitutie Slechte gezondheid Fysiek: Druggebruik Recente arrestatie Seksueel: Vrouw Dakloos Homo- of biseksueel
North et al., 1995	900 daklozen (18 jaar en ouder) waarvan een groot deel psychiatrisch patiënt of drugverslaafd	VS, St. Louis	Cross-sectioneel	6 maanden	Onderdeel van Social Readjustment Rating Scale	Ernstig fysiek en seksueel geweld	10.0 vrouwen 12.0 mannen	-
Wenzel et al., 2000	1563 daklozen (18-77 jaar) waarvan een groot deel psychiatrisch patiënt of drugverslaafd	VS, Los Angeles	Cross-sectioneel	1 maand	2 gestructureerde vragen	Ernstig fysiek en seksueel geweld	Overall: 23.0 vrouwen 21.0 mannen Fysiek: 18.0 vrouwen 20.0 mannen Seksueel: 9.0 vrouwen 1.0 mannen	Multivariaat: Vrouwen: Hispanic (vs White en Afro-American) Druggebruik (vs alcoholgebruik) Inkomen uit 'survival strategies' Manische symptomen Slechte fysieke gezondheid Mannen: Hispanic (vs White en Afro-American) Skid Row Slaapt op straat Alcoholverslaafd (vs druggebruik) Inkomen uit 'survival strategies' Depressief (vs schizofreen of manisch)

Tabel 6: Prevalentie en risicofactoren van victimisatie onder patiënten binnen de forensische zorg en penitentiaire instellingen								
Auteurs	Steekproef	Land	Type onderzoek	Periode	Operationalisatie geweld	Definitie van geweld	Prevalentie victimisatie (%)	Predictoren
Ireland, 2004	30 patiënten (25-58 jaar) van forensische instelling met een persoonlijkheidsstoornis	GB	Cross-sectioneel	1 week	Gestructureerde vraag	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld	23.0	Univariaat: Kwetsbare, subassertieve personen Eenlingen, introvert Meer (opvallende) psychiatrische symptomen Fysiek zwakker Lage intelligentie Alleen voor mannen: Veroordeeld zijn voor een seksueel vergrijp
Ireland & Bescoby, 2005	53 mannelijke patiënten (22-64 jaar) van een forensische instelling met een persoonlijkheidsstoornis	GB	Cross-sectioneel	Afgelopen week en maand	Aanpassing van de Direct and Indirect Prisoner Behaviour Checklist (DIPC)	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld	64.2 afgelopen week 69.8 afgelopen maand	Multivariaat: Victim/bully vs pure victim Victim/bullies laten meer negatief gedrag naar anderen zien
Ireland, 2006	44 patiënten (22-64 jaar) van een forensische instelling met psychiatrische problematiek	GB	Cross-sectioneel	1 week	Gestructureerde vraag	Mild en ernstig fysiek, seksueel en emotioneel geweld	30.0 vrouwen 3.0 mannen 11.0 totaal	Univariaat: Kwetsbare, subassertieve personen Eenlingen, introvert Meer (opvallende) psychiatrische symptomen Fysiek zwakker Alleen voor mannen: Veroordeeld zijn voor een seksueel vergrijp
Wolff et al., 2007	1494 gevangenen (18 jaar en ouder) met schizofrenie, PTSS, affectieve en angststoornissen	VS, a Mid-Atlantic state	Cross-sectioneel	6 maanden	Onderdeel van de National Violence Against Women and Men- Surveys	Seksueel geweld door medegevangene of stafflid	27.2 vrouwen 15.1 mannen	Univariaat: Vrouw Hispanic en Afro-American (vs White) Schizofrenie of bipolaire stoornis vs affectstoornis of geen stoornis